



Prairies céréalières : pourquoi, comment ?

A l'EARL La Pierre Plate, à St Florent des Bois, Luc Friconneau, éleveur de vaches laitières en système herbager, sème des mélanges céréaliers dans ses prairies depuis plus de 10 ans.

Semer des céréales dans ses prairies : quels intérêts ?

Luc identifie les prairies « fatiguées » : celles présentant des trous ou des plantes bioindicatrices reflétant des dysfonctionnements ou déséquilibres du sol (compaction, anaérobie, blocage des nutriments, excès d'azote, etc.).

Le passage en prairie céréalière permet au sol de s'aérer et à la prairie de se régénérer sans la retourner, tout en produisant du fourrage (enrubannage, foin) ou de la « paille de bouche » (mélange de paille et de foin distribué dans les auges des tarées et génisses et dans les logettes pour les laitières). La production de céréales est secondaire dans le système herbager de Luc qui saisit l'opportunité d'une récolte si elle se présente.

Quel itinéraire technique ?

Cette année, Luc a testé plusieurs modalités dont deux exemples sont présentés sur le schéma ci-dessous.

Le mélange céréalié semé est celui battu l'été dernier, non trié, qui contient : vesce, pois, épeautre, avoine, seigle et mélange prairial.

Avant, Luc passait un rota labour dans la prairie avant le semis du mélange. Il utilise maintenant une bêche roulante (Compil de chez Duro) : « Le sol est deux fois moins touché, ce qui diminue la minéralisation directe mais préserve le système mycorhizien, plus intéressant sur le long terme », Luc F.

Les décisions prises sur l'itinéraire répondent aux questions suivantes :

Juillet – Août (N)

« Mes prairies ont-elles besoin d'être régénérées ? »

Si oui : je sème un mélange céréalié

Mai (N+1)

« Je fauche ou je laisse pour moissonner ? »

Si la prairie prend le dessus : enrubannage au printemps puis retour dans le cycle de pâturage ou récolte de « paille de bouche »

Si le mélange céréalié prend le dessus : moisson à l'été puis récolte de « paille de bouche »

Août (N+1)

« Je pâture, je fauche, ou je sursème la prairie ? »

Je pâture si je peux, je fauche si j'ai trop d'herbe. Si la prairie n'est pas bien repartie, je la sursème avec du trèfle ou un mélange céréalié. On s'adapte selon l'état, le climat, les besoins.

T.T.

Sources : Luc Friconneau ; Atout Trèfle n°75

Pour en savoir plus

Rendez-vous chez Luc le 19 octobre à La Bougrière, 85310 St Florent des Bois pour un après-midi technique d'échanges et visites de parcelles



Mélange céréalié semé



Parcelle 1

du 04/03 au 10/07
Pâturage x3 (2,4 tMS/ha)
Enrubannage x1 (3 tMS/ha)
Irrigation 20 mm/ha x1

21/07
Bêche roulante x1
Semi Unidrill mélange
céréalié 90 kg/ha

22/07
Roulage x2

du 14/08 au 22/08
Irrigation 20mm/ha x2

Parcelle 2

du 02/02 au 23/05
Pâturage x3 (2,7 tMS/ha)
Foin x1 (0,8 tMS/ha)
Epanchage gypse 500 kg/ha x1

25/08
Bêche roulante x1
Semi Unidrill mélange
céréalié 90 kg/ha

28/08
Semi à la volée Trèfle
d'Alexandrie 12 kg/ha
Roulage x2

A suivre cet hiver
Epanchages de fumier,
chaux, soufre élémentaire
selon les parcelles

