

Enseignements de terrain



Toutes les prairies n'ont pas le même rôle



Fiche issue d'une journée d'échanges le 25 juin 2026 entre membres du GIEE "élevages autonomes". Elle présente les principaux enseignements retenus lors des observations de terrain, et des discussions autour de la gestion des prairies et du pâturage animées par Denis Alamome.

Chez Ignacio : Élevage bovin allaitant / 60 ha de surfaces pâturées et fauchées / 48 UGB / Exploitation créée en 2023 / Sols limono-sableux sensibles au dessèchement

Enjeux : Maintenir du pâturage malgré les sécheresses estivales / Réduire les besoins d'affouragement en été / Mieux utiliser la diversité des prairies / Construire plusieurs scénarios selon la météo de l'année

Une prairie n'a pas besoin d'être productive toute l'année pour être utile au système.

Prairies productives :

Fort potentiel de production au printemps.
Possibilité de dégager des surfaces pour la fauche.
Rôle important dans la constitution des stocks.

Prairies humides

Réserve stratégique pour les périodes sèches.
À préserver pour les moments où l'herbe devient rare.
Fonction de sécurité plus que de performance.

Prairies à améliorer

Flore peu appétente.
Couvert hétérogène.
Potentiel d'amélioration identifié par le groupe.

A RETENIR : Chercher à faire jouer le même rôle à toutes les parcelles conduit souvent à perdre en souplesse -> attribuer une fonction principale à chaque prairie permet de mieux sécuriser le système tout au long de l'année.

*Une prairie peut être utilisée différemment
selon la météo et la dynamique de pousse.*

Année avec pluies régulières

Objectif :

Valoriser la pousse et constituer des stocks.

Leviers :

maintenir une rotation dynamique ;
exploiter les repousses ; réserver certaines
surfaces à la fauche ; constituer des stocks
pour l'hiver.

Point de vigilance : Ne pas consommer
trop vite toutes les surfaces disponibles au
printemps.

Année sèche

Objectif : Conserver de l'herbe disponible le
plus longtemps possible.

Leviers :

- ralentir la rotation ;
- mobiliser les prairies humides ;
- utiliser le report sur pied ;
- adapter les lots aux ressources disponibles ;
- préserver les parcelles de sécurité.

Point de vigilance :

Accepter parfois une baisse de qualité pour
conserver du volume.



*La fonction d'une prairie aujourd'hui
n'est pas forcément celle qu'elle aura
demain.*

Cas d'une prairie à faible productivité, avec forte
présence de porcelle : **Comment faire évoluer
une prairie peu productive vers une prairie plus
fonctionnelle ?**

Bale grazing : concentration des déjections ; apport de matière organique ; amélioration de la fertilité.

Gestion du pâturage : passages rapides ; adaptation du chargement ; choix des catégories animales.

Report sur pied : sécuriser du volume ; favoriser certaines dynamiques végétales.

Fauche : rééquilibrer certaines parcelles ; gérer les excédents ; adapter la pression de pâturage.

Cédric Rutter : 06 33 51 93 94 / charentelimousine@civam.org